

ルンスミオ療法【2コース目】

【血液内科】259【悪性リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	~21
施行日	/	/
ルンスミオ	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



投与量	※投与量の参考
薬剤名	標準投与量
ルンスミオ	60mg/body

■注意・確認事項

- ルンスミオ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。
- CRS予防のため、ルンスミオ投与30~60分前に副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与すること。
- ルンスミオ投与によりサイトカイン放出症候群(CRS)が起こる場合があるので注意すること。
- 1コース目の忍容性が良好の場合、ルンスミオの投与時間を2時間まで短縮できる。
- インラインフィルターは使用しないこと。

《CRS及びTLS予防のための対策(適正使用ガイド:臨床試験におけるTLSの予防措置)》

・TLS発症リスクが高いと判断される患者には、本剤投与時にTLS予防措置を実施すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師