

C-MOPP療法

【血液内科】26【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン

下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	5	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	休薬	↓	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	↓	休薬	休薬	
塩酸プロカルバジン	経口: Day1-14			休薬	休薬	
プレドニン(第1,4コース)	経口: Day1-14			休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	1.4mg/m ² mg/Body
エンドキサン	650mg/m ² mg/Body
塩酸プロカルバジン(経口)	100mg/m ² mg/Body
プレドニン(経口)	40mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

※Day1-14服用

※Day1-14服用(第1,4コース)

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師