

# VR(BS)-CAP療法【1コース目】(day1)

## 【血液内科】263-1【マントル細胞リンパ腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	4	8	11	15	~21
施行日	/	/	/	/	/		/
ベルケイド	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬
リツキシマブBS	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
ドキシソルピシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬
プレドニン	↓	経口: Day2-5		休薬	休薬	休薬	休薬

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
リツキシマブBS	375 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ドキシソルピシン	50 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
プレドニン	mg/m <sup>2</sup>	100 mg/Body

入力薬剤師	看護師	看護師

### ■注意・確認事項

○ドキシソルピシンは総投与量500mg/m<sup>2</sup>を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。