

# VR(BS)-CAP療法【1コース目】(day2)

## 【血液内科】263-2【マントル細胞リンパ腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	4	8	11	15	~21
施行日	/	/	/	/	/		/
ベルケイド	↓	休薬	↓	↓	↓	休薬	
リツキシマブBS	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	経口: Day2-5		休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
※①	10時	ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
リツキシマブBS	375 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
プレドニン	mg/m <sup>2</sup>	100 mg/Body

入力薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- リツキシマブ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキシマブの投与速度  
 25mL/hr 1時間、50mL/hr 1時間、100mL/hr 1時間、以降 200mL/hr