

VR(BS)-CAP療法【2コース目以降】(day1)

【血液内科】264-1【マントル細胞リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	4	8	11	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
ベルケイド	↓	↓	↓	↓	休薬	
リツキシマブBS	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	経口: Day2-5	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	●ベルケイド【 】mg 生食 1.2mL 皮下注射 ※ベルケイド1Vを生食1.2mLで溶解
※①	10時	ソルデム3A 500mL 8時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服(必要時) → 別途内服オーダー ボラミン注5mg 1A 30分 生食 100mL
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	14時30分	プレドニン注20mg 5A 30分 グラニセトロンバッグ 100mL
④	15時	●ドキシソルビシン【 】mg 生食 100mL 30分
⑤	15時30分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベルケイド	1.3 mg/m ² mg/Body
リツキシマブBS	375 mg/m ² mg/Body
ドキシソルビシン	50 mg/m ² mg/Body
エンドキサン	750 mg/m ² mg/Body
プレドニン	mg/m ² 100 mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- リツキシマブ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキシマブの投与速度
50mL/hr 30分、100mL/hr 30分、以降 200mL/hr
- ドキシソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。