

R(BS)-THP-COP療法(Day2)【血液内科】30-2【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	6	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬		休薬	休薬	
オンコビン	休薬	↓		休薬	休薬	
ピノルビン	休薬	↓		休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	↓		休薬	休薬	
プレドニン	休薬	↓	経口:Day3-6	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注【 】mg グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ピノルビン【 】mg 5%ブドウ糖 100mL 30分
④	11時15分	●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
オンコビン	1mg/m ² mg/Body
ピノルビン	30mg/m ² mg/Body
エンドキサン	500mg/m ² mg/Body
プレドニン	30mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

○ピノルビンは総投与量950mg/m²を超えるとうっ血性心不全を起こすことが
多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師