

DeVIC療法(Day2,3)

【血液内科】31-2,3【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	休薬	休薬	
イホマイド	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー オルガドロン注19mg 2V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 2時間
③	12時25分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開
④	12時30分	●イホマイド【 】mg 生食 500mL 2時間
⑤	16時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開
⑥	20時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL 全開

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
カルボプラチン	300mg/m ²	mg/Body
ベプシド	100mg/m ²	mg/Body
イホマイド	1500mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ウロミテキサンはイホマイド投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。

○ウロミテキサンの1回量はイホマイドの20%の量(mg)

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。