

R(BS)-DeVIC療法(Day2)

【血液内科】32-2【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
カルボプラチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ペプシド	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	
イホマイド	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	備考
		メイン輸液	※臨時処方で別オーダー
※①	10時	アプレピタントCap125mg 1Cap	
※①	10時	オルガドロン注19mg 2V グラニセトンバッグ 100mL	30分
②	10時30分	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間
③	11時30分	●ペプシド【 】mg 生食 500mL	2時間
④	13時25分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開
⑤	13時30分	●イホマイド【 】mg 生食 500mL	2時間
⑥	17時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開
⑦	21時30分	●ウロミテキサン【 】mg 生食 50mL	全開

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	参考
リツキシマブBS	375mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	300mg/m ²	mg/Body
ペプシド	100mg/m ²	mg/Body
イホマイド	1500mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ウロミテキサンはイホマイド投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。

○ウロミテキサンの1回量はイホマイドの20%の量(mg)

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay2に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay3,4に投与する。