

EPOCH療法 (Day1)

【血液内科】34-1【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
プレドニン	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
オンコビン	0.4mg/m ²	mg/Body →最高用量 2mg/body
ベプシド	50mg/m ²	mg/Body
ドキシソルビシン	10mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	750mg/m ²	mg/Body
プレドニン	60mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ドキシソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。