

# EPOCH療法 (Day2,3)

## 【血液内科】34-2,3【悪性リンパ腫】 (第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 8  | 15 | ~21 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日     | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| オンコビン   | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| ベプシド    | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| ドキソルビシン | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| エンドキサン  | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |
| プレドニン   | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間   |                                                                                           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※①  | 10時    | ↓<br>ソルデム3A 500mL 12時間                                                                    |
| ※①  | 10時    | 同時に<br>側管より<br>アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダ<br>プレドニン注【      】mg<br>グラニセトロンバッグ 100mL 30分 |
| ②   | 10時30分 | ●オンコビン【      】mg<br>●ベプシド【      】mg<br>●ドキソルビシン【      】mg<br>生食 500mL 24時間                |
| ③   | 22時    | ↓<br>ソルデム3A 500mL 12時間<br>翌日10時まで                                                         |

### ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名     | 標準投与量                        |
|---------|------------------------------|
| オンコビン   | 0.4mg/m <sup>2</sup> mg/Body |
| ベプシド    | 50mg/m <sup>2</sup> mg/Body  |
| ドキソルビシン | 10mg/m <sup>2</sup> mg/Body  |
| エンドキサン  | 750mg/m <sup>2</sup> mg/Body |
| プレドニン   | 60mg/m <sup>2</sup> mg/Body  |

→最高用量 2mg/body

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |

### ■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m<sup>2</sup>を超えると重篤な心筋障害を起こすことが  
多くなるので注意すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に  
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。