

EPOCH療法 (Day5)

【血液内科】34-5【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
オンコビン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
プレドニン	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注【 】mg グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 2時間
③	22時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間 ↓ 翌日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
オンコビン	0.4mg/m ² mg/Body
ベプシド	50mg/m ² mg/Body
ドキソルビシン	10mg/m ² mg/Body
エンドキサン	750mg/m ² mg/Body
プレドニン	60mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師