

R(BS)-EPOCH療法(Day2)

【血液内科】35-2【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | ~21 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| リツキシマブBS | ↓ | 休薬 | |
| オンコビン | 休薬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休薬 | | | |
| ベプシド | 休薬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| ドキシソルビシン | 休薬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| エンドキサン | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| プレドニン | 休薬 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 休薬 | 休薬 | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | 参考 |
|----------|----------------------|------------------------|
| リツキシマブBS | 375mg/m ² | mg/Body |
| オンコビン | 0.4mg/m ² | mg/Body →最高用量 2mg/body |
| ベプシド | 50mg/m ² | mg/Body |
| ドキシソルビシン | 10mg/m ² | mg/Body |
| エンドキサン | 750mg/m ² | mg/Body |
| プレドニン | 60mg/m ² | mg/Body |

| 入力薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-------|-----|-----|
| | | |

■注意・確認事項

○ドキシソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay2に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay3,4に投与する。