

R(BS)-EPOCH療法(Day5)

【血液内科】35-5【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	8	15	~21
施行日		/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ペプシド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
プレドニン	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より プレドニン注【 】mg グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン【 】mg ●ペプシド【 】mg ●ドキシソルビシン【 】mg 生食 500mL 24時間
③	22時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
オンコビン	0.4mg/m ² mg/Body
ペプシド	50mg/m ² mg/Body
ドキシソルビシン	10mg/m ² mg/Body
エンドキサン	750mg/m ² mg/Body
プレドニン	60mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

○ドキシソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが
多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師