

ESHAP療法(Day2,3)

【血液内科】36-2,3【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ベプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー ソル・メドロール注500mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ベプシド【 】mg 生食 250mL 1時間
③	11時30分	●ランダ【 】mg 生食 500mL 24時間
④	22時	グラニセトロンバッグ 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベプシド	40mg/m ²	mg/Body
ランダ	25mg/m ²	mg/Body
シタラビン	2000mg/m ²	mg/Body
ソル・メドロール	mg/m ²	500mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。