

R(BS)-ESHAP療法(Day1)

【血液内科】37-1【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
リツキシマブBS	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ペプシド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ランダ	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
シタラビン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服(必要時) → 別途内服オーダー ポララミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
ペプシド	40mg/m ² mg/Body
ランダ	25mg/m ² mg/Body
シタラビン	2000mg/m ² mg/Body
ソル・メドロール	mg/m ² 500mg/Body

■注意・確認事項

- リツキシマブ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキシマブの投与速度
50mL/hr 30分、100mL/hr 30分、以降 200mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師