

GCD療法 (Day1)

【血液内科】38-1【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ゲムシタビン	↓	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 500mL 3時間
※①	10時	同時に 側管より アプレピタントCap125mg 1Cap パロノセトロン注0.75mg 1V オルガドロン注19mg 2V 生食 100mL 30分
※①	10時	
②	10時30分	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
③	11時30分	●ゲムシタビン【 】mg 生食 100mL 30分
④	13時	生食注シリンジ 20mL ロック用

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
カルボプラチン	AUC = 5 mg/Body
ゲムシタビン	1000mg/m ² mg/Body
オルガドロン	mg/m ² 38mg/Body

■注意・確認事項

○ゲムシタビン投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師