

## GDP療法 (Day2,3)

【血液内科】39-2,3【悪性リンパ腫】  
(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

## ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day    | 1 | 2  | 3  | 4  | 8  | 15 | ~21 |
|--------|---|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日    | / | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| ランダ    | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| ゲムシタビン | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| オルガドロン | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |

## ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間   |                                                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------|
| ①   | 10時    | アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダ<br>オルガドロン注19mg 2V<br>生食 100mL 30分 |
| ②   | 10時30分 | 生食注シリンジ 20mL ロック用                                                |

## ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量                 |           |
|--------|-----------------------|-----------|
| ランダ    | 75mg/m <sup>2</sup>   | mg/Body   |
| ゲムシタビン | 1000mg/m <sup>2</sup> | mg/Body   |
| オルガドロン | mg/m <sup>2</sup>     | 38mg/Body |

## ■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に  
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |