## ICE療法(Day1)

## 【血液内科】40-1【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m²	Cr:	mg/dL

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
ベプシド カルボプラチン	↓	↓ ↓	↓ 休薬	休薬 休薬	休薬 休薬	
イホマイド ウロミテキサン	休薬 休薬		(24時間) (24時間)	休薬 休薬	休薬 休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方で別オーダ
1	10時	
2	10時30分	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 2時間
3	22時	◆ グラニセトロンバッグ 100mL <sub>30分</sub>
		<b>↓</b>

## ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準排	<b>殳</b> 与量
ベプシド	100mg/m2	mg/Body
カルボプラチン	AUC = 5	mg/Body
イホマイド	5000mg/m2	mg/Body
ウロミテキサン	5000mg/m2	mg/Body

■注意·確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師