

ICE療法 (Day2)

【血液内科】40-2【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
ベプシド	↓	↓	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
イホマイド	休薬	→ (24時間)		休薬	休薬	
ウロミテキサン	休薬	→ (24時間)		休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方で別オーダー
※①	10時	
※①	10時	アプレピタントCap125mg 1Cap グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 2時間
③	12時30分	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
④	13時30分	●イホマイド【 】mg ●ウロミテキサン【 】mg 生食 500mL 24時間 ※ベプシドとは別ルートより投与
⑤	22時	グラニセロンバッグ 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベプシド	100mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	AUC = 5 mg/Body
イホマイド	5000mg/m ² mg/Body
ウロミテキサン	5000mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay2に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay3,4に投与する。