ICE療法(Day3)

【血液内科】40-3【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

 診療科:
 病棟:

 医師名:
 印

 身長:
 cm
 体重:
 kg

 体表面積:
 m²
 Cr:
 mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする Day 3 8 15 ~21 2 施行日 / / ベプシド 1 ļ 1 休薬 休薬 カルボプラチン 休薬 休薬 \downarrow 休薬 休薬 休薬 イホマイド → (24時間) 休薬 休薬 ウロミテキサン 休薬 → (24時間) 休薬 休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

_■投与順序 ※マークは同タイミンク投与楽あり						
滴下順	投与時間	メイン輸液 ※臨時処方で別オーダ				
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダ				
	-	◆ グラニセトロンバッグ 100mL 30分				
2	10時30分	◆ ベプシド【 】mg 生食 500mL 2時間				
3	22時	◆ グラニセトロンバッグ 100mL 30分				
		*				

■投与量 ※投与量の参考

	··· ,,,, - · ·	
薬剤名	標準法	殳 与量
ベプシド	100mg/m2	mg/Body
カルボプラチン	AUC = 5	mg/Body
イホマイド	5000mg/m2	mg/Body
ウロミテキサン	5000mg/m2	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意·確認事項

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay2に アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay3,4に投与する。