

MCE療法(Day2)

【血液内科】41-2【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	
サイメリン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時25分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
※③	10時30分	●エンドキサン【 】mg 3時間 生食 500mL
※③	10時30分	●ベプシド【 】mg 全量を3時間で注入 ※原液で
④	14時30分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
⑤	18時30分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
⑥	22時	グラニセロンバッグ 100mL 30分
⑦	22時30分	●ベプシド【 】mg 全量を3時間で注入 ※原液で

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エンドキサン	60mg/kg mg/Body
ベプシド	250mg/m ² × 2 mg/Body
サイメリン	250mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- ウロミテキサンはエンドキサン投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。
○ウロミテキサンの1回量はエンドキサンの40%の量 (mg)

入力 薬剤師	看護師	看護師