

MCE療法(Day6)

【血液内科】41-6【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/
エンドキサン	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	休薬	↓	↓	↓	休薬	休薬	
サイメリン	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	← グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●サイメリン【 】mg 1時間 生食 250mL
③	22時	← グラニセトンバッグ 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エンドキサン	60mg/kg	mg/Body
ベプシド	250mg/m ² × 2	mg/Body
サイメリン	250mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師