

MEAM療法(Day6)

【血液内科】42-6【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
サイメリン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
キロサイド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	休薬	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
アルケラン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	
※①	10時	同時に 側管より アプレピタントCap125mg 1Cap グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●アルケラン【 】mg 生食 100mL 30分
③	22時	ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
サイメリン	300mg/m ² mg/Body
キロサイド	200mg/m ² × 2回 mg/Body
ベプシド	200mg/m ² mg/Body
アルケラン	140mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○アルケランは調製後90分以内に投与を終了すること(安定性が低下するため)。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay6に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay7,8に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師