

# Pola+GHP療法(体重45kg未満)【2コース目以降】

## 【血液内科】46【B細胞性悪性リンパ腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

<b>診療科:</b>	<b>病棟:</b>
<b>医師名:</b>	印

<b>身長:</b>	cm	<b>体重:</b>	kg
<b>体表面積:</b>	m <sup>2</sup>	<b>Cr:</b>	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
ポライビー	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルピシン	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	休薬	
プレドニン	↓	経口: Day2-5	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に側管より <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">                     カロナール内服 → 別途内服オーダー                      ポラミン注5mg 1A                      プレドニン注20mg 5A                      生食 100mL 30分                 </div>
②	10時30分	●ポライビー( )mg 注射用水 生食 50mL 30分 <small>※ポライビー30mgは注射用水1.8mLで溶解                      ※ポライビー140mgは注射用水7.2mLで溶解                      (溶解後濃度: 20mg/mL)</small>
③	11時	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
④	11時30分	●ドキシソルピシン( )mg 生食 100mL 30分
⑤	12時	●エンドキサン( )mg 生食 500mL 2時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ポライビー	1.8mg/kg	mg/Body
ドキシソルピシン	50mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
プレドニン	mg/m <sup>2</sup>	100mg/Body

- 注意・確認事項
- リツキシマブと併用すること。
  - 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
  - ポライビー投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
  - ポライビー初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。
  - ドキシソルピシンは総投与量500mg/m<sup>2</sup>を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。
  - 最大6サイクル投与とする。

入力薬剤師	看護師	看護師