

SMILE療法(Day2,3)

【血液内科】47-2,3【悪性リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	10	12	14	16	18	20	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
メントレキセート	↓	休薬										
ペブシド	休薬	↓	↓	↓	休薬							
イホマイド	休薬	↓	↓	↓	休薬							
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬							
ロイナーゼ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー オルガドロン注19mg 2V 30分 グラニセトロンバッグ 100mL
②	10時30分	●ペブシド【 】mg 2時間 生食 500mL
③	12時25分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
④	12時30分	●イホマイド【 】mg 2時間 生食 500mL
⑤	16時30分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL
⑥	20時30分	●ウロミテキサン【 】mg 全開 生食 50mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
メントレキセート	2000mg/m ²	mg/Body
ペブシド	100mg/m ²	mg/Body
イホマイド	1500mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body
ロイナーゼ	6000U/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- ウロミテキサンはイホマイド投与直前と4時間後、8時間後に投与すること。
- ウロミテキサンの1回量はイホマイドの20%の量(mg)
- アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。