

## リツキサン療法【2コース目以降】

【血液内科】57【悪性リンパ腫】  
(第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m<sup>2</sup>

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

|       |   |    |
|-------|---|----|
| Day   | 1 | ~7 |
| 施行日   | / | /  |
| リツキサン | ↓ |    |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間   |                                                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ※①  | 10時    | ソルデム3A 500mL 5時間                                                  |
| ※①  | 10時    | 同時に側管より<br>カロナール内服(必要時) → 別途内服オーダー<br>ポラミン注5mg 1A<br>生食 100mL 30分 |
| ②   | 10時30分 | ●リツキサン【      】mg<br>生食 500mL<br>投与速度は「■注意事項」参照                    |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名   | 標準投与量                        |
|-------|------------------------------|
| リツキサン | 375mg/m <sup>2</sup> mg/Body |

■注意・確認事項

- リツキサン投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキサンの投与速度  
50mL/hr 30分、100mL/hr 30分、以降 200mL/hr
- 最大投与回数は8回とする。
- 維持療法に用いる場合は、投与間隔は8週間を目安とし、最大投与回数は12回とする。

| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
|           |     |     |