

リツキシマブ(BS)療法【2コース目以降】(90分)**【血液内科】60【悪性リンパ腫】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

Day	1	~7
施行日	/	/
リツキシマブBS	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 3時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服(必要時) → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A 30分 生食 100mL
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 1時間30分 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- リツキシマブは、臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リンパ球数が5000/ μ L未満である場合、90分で投与可
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキシマブの投与速度
200mL/hr で30分投与後、残り全量を60分で投与
- 最大投与回数は8回とする。
- 維持療法に用いる場合は、投与間隔は8週間を目安とし、最大投与回数は12回とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師