

ブスルフェクス+リサイオ療法(Day2,3,4)**【血液内科】62-2,3,4【悪性リンパ腫】****(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ブスルフェクス	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
リサイオ	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より アプレピタントカプセル80mg 1Cap → 別途内服オーダー デキサート注6.6mg 1V グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●ブスルフェクス【 】mg 生食 適量 3時間 ※10倍量の生食に希釈(11倍希釈)
③	22時	↓ ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ブスルフェクス	3.2mg/kg	mg/Body
リサイオ	5mg/kg	mg/Body

■注意・確認事項

○中心静脈から投与すること。

○痙攣予防として抗痙攣薬(レベチラセタム等)の投与を考慮すること。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師