

ブスルフェクス+リサイオ療法(Day5)

【血液内科】62-5【悪性リンパ腫】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	~
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ブスルフェクス	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
リサイオ		休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ブスルフェクス	3.2mg/kg	mg/Body
リサイオ	5mg/kg	mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 痙攣予防として抗痙攣薬(レベチラセタム等)の投与を考慮すること。
- アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師