## (脳)大量シタラビン療法(Day1)

## 【血液内科】63-1【悪性リンパ腫】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:	
医師名:	印	

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>*</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン	下記が1コー	スの投-	テスケジュー	ール : 3~	5週ごとを1	
Day		1	2	8	15	~ 21~35
<mark>施行日</mark>		/	/	/	/	/
シタラビン		<b>1</b>	$\downarrow$	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

■汉丁顺广		は同グリベング以子未のり		
滴下順	投与時間	1		
		メイン輸液 ※臨時処方で別オーダ		
<b>%</b> ①	10時	アプレピタントCap125mg 1Cap		
<b>%</b> ①	10時	◆ グラニセトロンバッグ 100mL 2045		
		◆ グラニセトロンバッグ 100mL 30分		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2	10時30分	● シタラビン 【 mg		
	' ' '	生食 500mL 3時間		
		<b>▼</b>		

_■投与量	※投与量 <i>0</i>	※投与量の参考		
薬剤名	標準排	<b>设</b> 与量		
シタラビン	3000mg/m2	mg/Body		

※60歳以上1000mg/m2に減量

## ■注意·確認事項

〇アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師