

大量メソトレキセート(MPV)療法 (Day1)

【血液内科】64-1【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	/
メソトレキセート	↓	休薬	
オンコビン	↓	休薬	
メソトレキセート(髄注)	休薬	↓	
デキサート(髄注)	休薬	↓	
塩酸プロカルバジン(第1,3,5コース)	経口: Day1-7		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	← グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●メソトレキセート【 】mg 生食 500mL 3時間
③	13時30分	← ●オンコビン【 】mg 生食 50mL 30分

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
メソトレキセート	3500mg/m ²	mg/Body
オンコビン	1.4mg/m ²	mg/Body
メソトレキセート(髄注)	mg/m ²	12mg/Body
デキサート(髄注)	mg/m ²	3.3mg/Body
塩酸プロカルバジン(経口)	100mg/m ²	mg/Body

→ 最高用量 2mg/body

※Day1-7服用(第1,3,5コース)

■注意・確認事項

○ロイコボリンレスキューについては別途指示を確認すること

入力 薬剤師	看護師	看護師