悪性リンパ腫・ALL髄注療法

■エンボス

【血液内科】66【悪性リンパ腫・急性リンパ性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| 診療科: | 病棟: | |
|------|-----|---|
| 医師名: | | 印 |

| 身長: | cm | 体重: | kg |
|-------|----------------|-----|-------|
| 体表面積: | m [*] | Cr: | mg/dL |

| ~ |
|---|
| |
| |
| |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| | | リアイミングスプ末のグ | | |
|-----|------------|-------------------|--|--|
| 滴下順 | 投与時間 | | | |
| 1 | 1日1回 | ●メソトレキセート 12~15mg | | |
| | (投与時間指示あり) | | | |
| | | プレドニン注 10~20mg | | |
| | | 生食 | | |
| | | ※全量5mLとする | | |
| | | | | |
| | | | | |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準 | 投与量 |
|----------|-------|--------------|
| メソトレキセート | mg/m2 | 12~15mg/Body |
| キロサイド | mg/m2 | 40mg/Body |
| プレドニン | mg/m2 | 10~20mg/Body |

■注意·確認事項

| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
| | | |
| | | |