Pola+BR(BS)療法(体重45kg以上)【1コース目】(Day2)

【血液内科】7-2【悪性リンパ腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
リツキシマブ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ポライビー	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	
トレアキシシ	休薬	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	投与内容	時間
※①	10時	ソルデム3A 500mL	4時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー ポララミン注5mg 1A デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL	30分
②	10時30分	●ポライビー【 】mg 注射用水 生食 100mL	1時間30分
③	12時	グラニセトロンバッグ 100mL	30分
④	12時30分	●トレアキシシ【 】mg 生食 250mL	1時間

※ポライビー30mgは注射用水1.8mLで溶解
 ※ポライビー140mgは注射用水7.2mLで溶解
 (溶解後濃度: 20mg/mL)

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
リツキシマブBS	375mg/m ²	mg/Body
ポライビー	1.8mg/kg	mg/Body
トレアキシシ	90mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ポライビー投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- ポライビー初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮可。
- トレアキシシは調製後6時間以内に投与を終了すること。
- 最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師