

A+AVD療法

【血液内科】72【ホジキンリンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
エクザール	↓	休薬	↓	休薬	
ドキソルビシン	↓	休薬	↓	休薬	
ダカルバジン	↓	休薬	↓	休薬	
アドセトリス	↓	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 5時間
※①	10時	同時に 側管より ソル・メドロール注125mg 1V グラニセロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●エクザール【 】mg 生食 50mL 15分
③	10時45分	●ドキソルビシン【 】mg 生食 100mL 30分
④	11時15分	●ダカルバジン【 】mg 注射用水 生食 500mL 2時間 ※ダカルバジン1V当り注射用水10mLで溶解
⑤	13時15分	●アドセトリス【 】mg 注射用水 生食 100mL 30分 ※アドセトリス1V当り注射用水10.5mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エクザール	6mg/m ² mg/Body
ドキソルビシン	25mg/m ² mg/Body
ダカルバジン	375mg/m ² mg/Body
アドセトリス	1.2mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こす
ことが多くなるので注意すること。

○ダカルバジン投与時は輸液バッグ・ルート共に遮光(血管痛防止のため)

入力 薬剤師	看護師	看護師