

Pola+BR(BS)療法(体重45kg以上)【2コース目以降】(Day1)

【血液内科】8-1【悪性リンパ腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
リツキシマブ	↓	休薬	休薬	休薬	
ポライビー	休薬	↓	休薬	休薬	
トレアキシン	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 6時間
※①	10時	同時に 側管より カラナール内服(必要時) → 別途内服オーダー ポラミン注5mg 1A デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	10時30分	●リツキシマブBS【 】mg 生食 500mL 投与速度は「■注意事項」参照
③	14時30分	グラニセトロンバッグ 100mL 30分
④	15時	●トレアキシン【 】mg 生食 250mL 1時間

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
リツキシマブBS	375mg/m ² mg/Body
ポライビー	1.8mg/kg mg/Body
トレアキシン	90mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- リツキシマブ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- リツキシマブの投与速度
50mL/hr 30分、100mL/hr 30分、以降 200mL/hr
- トレアキシンは調製後6時間以内に投与を終了すること。
- 最大6サイクル投与とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師