

E-Pd療法【3コース目以降】**【血液内科】120【多発性骨髄腫】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
エムプリシティ	↓	休薬	休薬	休薬	
デキサート	↓	休薬	休薬	休薬	
レナデックス(経口)	↓	↓	↓	↓	
レブラミド		経口: Day1-21		休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 250mL 20mL/hr(終了時残破棄)
※①	10時	同時に 側管より デキサート注6.6mg 1V 生食 50mL 15分
②	10時15分	ポララミン注5mg 1A ガスター注20mg 1A 生食 50mL 15分
③	11時	●エムプリシティ【 】mg 注射用水 生食 150mL (エムプリシティ:1000mg未満) 生食 250mL (エムプリシティ:1000~1800mg) 生食 350mL (エムプリシティ:1800mg超) 投与速度は「■注意事項」参照 ※エムプリシティ300mgは注射用水13mLで溶解 ※エムプリシティ400mgは注射用水17mLで溶解 (溶解後濃度:25mg/mL)

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エムプリシティ	20mg/kg mg/Body
デキサート	mg/m ² 6.6mg/Body
レナデックス(経口)	《Day1》28mg/Body 《Day8,15,22》40mg/Body
ポマリスト(経口)	mg/m ² 4mg/Body

◎75歳超:8mg/body

◎75歳超:20mg/body

※エムプリシティ投与の3~24時間前に服用

※Day1~Day21服用(7日間休薬)

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- エムプリシティ投与時は輸液ポンプを使用すること。
- エムプリシティ投与中または投与開始後24時間以内に infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- エムプリシティの投与速度
初回: 180mL/hr 30分 ⇒ 残り 240mL/hr 2回目以降: 300mL/hr

入力 薬剤師	看護師	看護師