## Kd(週2回)療法【1コース目】

## 【血液内科】135【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>°</sup>	Cr:	mg/dL

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
<b>施行日</b>	/	/	/	/	/	/	/	/	/
コイプロリス	<b>↓</b>	↓	↓	<b>1</b>	↓	↓	休薬	休薬	
ノナデックス(経口)	↓	1	1	$\downarrow$	1	$\downarrow$	1	1	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

■汉丁顺	<u> 7 / 1 / 1 </u>	は向が行うと見て来のう
滴下順	投与時間	
*1	10時	<u>5%ブドウ糖 250mL</u> 1時間
*①	10時	□時に 側管より 側管より が対けつける【

■投与量 ※投与量の参考

	N $N$ $N$ $N$ $N$ $N$ $N$ $N$ $N$ $N$
薬剤名	標準投与量
カイプロリス	《Day1,2》 20mg/m2 《Day8,9,15,16》 56mg/m2
レナデックス(経口)	mg/m2 20mg/Body

## ■注意·確認事項

〇カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内に infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師