

KRd療法【13コース目以降】

【血液内科】139【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
カイプロリス	↓	↓	休薬	休薬	↓	↓	休薬	休薬	
レナデックス(経口)	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
レブラミド	経口: Day1~21						休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	5%ブドウ糖 100mL 30分
※①	10時	同時に 側管より
		●カイプロリス【 】mg 注射用水 5%ブドウ糖 20mL 10分 ※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解 ※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
カイプロリス	27mg/m ²	mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ²	40mg/Body
レブラミド(経口)	mg/m ²	25mg/Body

※Day1~Day21服用(7日間休薬)

■注意・確認事項

○カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師