

MEL200療法(Day2)

【血液内科】141-2【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:

病棟:

医師名:

印

身長:

cm

体重:

kg

体表面積:

m²

Cr:

mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール:

Day	1	2	~
施行日	/	/	
アルケラン	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方では別オーダー
①	10時	アプレピタントカプセル80mg 1Cap ➡ 別途内服オーダー ← グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	← ●アルケラン【 】mg 30分 生食 100mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アルケラン	100mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- アルケランは調製後90分以内に投与を終了すること(安定性が低下するため)
- アルケランは糖類を含む輸液と配合すると分解しやすいので使用しないこと。

○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダー)はDay1に

アプレピタントカプセル80mg(内服オーダー)はDay2,3に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師