

VTD-PACE療法 (Day1)

【血液内科】142-1【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	15	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ボルテゾミブ	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
サレド	経口: Day1-28							

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	●ボルテゾミブ【 】mg 生食 1.2mL 皮下注射 ※ボルテゾミブ1Vを生食1.2mLで溶解
※①	10時	ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より
※①	10時	
②	10時30分	●ランダ【 】mg ●ベプシド【 】mg ●ドキソルビシン【 】mg ●エンドキサン【 】mg 生食 500mL 24時間
③	22時	ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	10mg/m ² mg/Body
ベプシド	40mg/m ² mg/Body
ドキソルビシン	10mg/m ² mg/Body
エンドキサン	400mg/m ² mg/Body
オルガドロン	mg/m ² 38mg/Body
ボルテゾミブ	1mg/m ² mg/Body
サレド	50-400mg/Body (眠前)

入力 薬剤師	看護師	看護師

※Day1~Day28服用 (50mgから開始し漸増)

■注意・確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが
多くなるので注意すること。○アプレピタントカプセル125mg(レジメンオーダ)はDay1に
アプレピタントカプセル80mg(内服オーダ)はDay2,3に投与する。