■エンボス

VTD-PACE療法（Day2,3）

【血液内科】142-2,3【多発性骨髄腫】

（第　　コース目）

*網かけ部分は必須記入事項

診療科：	病棟：
医師名：	印

身長：　cm	体重：　kg
体表面積：　㎡	Cr：　mg/dL

■レジメン　下記が1コースの投与スケジュール　：　4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	15	～28
施行日	／	／	／	／	／	／	／	／
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキソルビシン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ボルテゾミブ	↓	休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
サレド	経口：Day1-28							

■投与順序　※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間
※①	10時
※①	10時
②	10時30分
③	22時

↓

ソルデム3A　500mL　12時間

アプレピタントカプセル80mg　1Cap ➡ 別途内服オーダ

同時に側管より ← オルガドロン注19mg　2V
生食　100mL　30分

●ランダ【　　】mg
●ベプシド【　　】mg
●ドキソルビシン【　　】mg
●エンドキサン【　　】mg
生食　500mL　24時間

ソルデム3A　500mL　12時間

↓

翌日10時まで

■投与量　　※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	10mg/m2	mg/Body
ベプシド	40mg/m²	mg/Body
ドキソルビシン	10mg/m2	mg/Body
エンドキサン	400mg/m2	mg/Body
オルガドロン	mg/m²	38mg/Body
ボルテゾミブ	1mg/m²	mg/Body
サレド	50-400mg/Body　（眠前）	

※Day1～Day28服用（50mgから開始し漸増）

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意･確認事項

○ドキソルビシンは総投与量500mg/㎡を超えると重篤な心筋障害を起こすことが多くなるので注意すること。

○アプレピタントカプセル125mg（レジメンオーダ）はDay1に
アプレピタントカプセル80mg（内服オーダ）はDay2,3に投与する。