

VTD-PACE療法 (Day4)

【血液内科】142-4【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	8	11	15	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ペプシド	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ドキシソルビシン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	
ボルテゾミブ		休薬	休薬	↓	↓	↓	休薬	
サレド								経口: Day1-28

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	10mg/m ²	mg/Body
ペプシド	40mg/m ²	mg/Body
ドキシソルビシン	10mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	400mg/m ²	mg/Body
オルガドロン	mg/m ²	38mg/Body
ボルテゾミブ	1mg/m ²	mg/Body
サレド	50-400mg/Body (眠前)	

※Day1~Day28服用 (50mgから開始し漸増)

■注意・確認事項

○ドキシソルビシンは総投与量500mg/m²を超えると重篤な心筋障害を起こすことが
多くなるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師