

(ダラキューロ)DLd療法【7コース目以降】

【血液内科】156【多発性骨髄腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | ~28 |
|------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ダラキューロ | ↓ 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| オルガドロン | ↓ 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| レナデックス(経口) | 休薬 ↓ | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| レブラミド | 経口: Day1-21 | | | | | | 休薬 | 休薬 | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間 | 投与内容 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※① | 10時 | 生食 100mL 2時間 |
| ※① | 10時 | 同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー モンテルカスト内服(主治医判断) ポララミン注5mg 1A オルガドロン注19mg 1V 生食 100mL 30分 |
| ② | 11時30分 | ●ダラキューロ配合皮下注 1V 皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に約3~5分かけて投与 |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | 参考 |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| ダラキューロ | 1回 1V (15mL) | ※ダラツムマブとして1800mg |
| オルガドロン | mg/m ² 19mg/Body | |
| レナデックス(経口) | mg/m ² 20mg/Body | |
| レブラミド(経口) | mg/m ² 25mg/Body | ※Day1~Day21服用(7日間休薬) |

■注意・確認事項

○ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に infusion reaction が起こる場合があるので注意すること。

| | | |
|-------|-----|-----|
| 入力薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |