(ダラキューロ)DKd療法【1コース目】(Day2,9,16) 【血液内科】157-2,9,16【多発性骨髄腫】

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m [*]	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール: 4週ごとを1コースとする 2 8 9 Day 15 16 22 23 ~28 施行日 / ダラキューロ 休薬 1 休薬 1 休薬 \downarrow 休薬 カイプロリス 1 1 1 休薬 休薬 オルガドロン 休薬 1 休薬 1 休薬 ↓ 休薬 レナデックス(経口) 休薬 休薬 休薬 休薬

■投与順序 ※マークは同々イミング投与薬あり

_	■投予順序が、これは向が行うとの分子の分			
	滴下順	投与時間		
	\mathbb{X}	10時	5%ブドウ糖 250mL 1時間	
	*1	10時	_ 同時に <mark>●カイプロリス【 Img</mark>	
			5%ブドウ糖 100mL 30分	
			※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解	
			※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解	屛
			↓	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量		
ダラキューロ	1回 1V(15mL)		
カイプロリス	《Day1,2》 20mg/m		
	《Day8,9,15,16》 56mg/m3		
オルガドロン	mg/m2 19mg/Bod		
レナデックス(経口)	mg/m2 20mg/Bod		

※ダラツムマブとして1800mg

◎75歳超:《Day1,2,8,15,22》20mg/body 《Day9,16》8mg/body Day23は内服なし

■注意·確認事項

〇カイプロリス投与中または投与開始後24時間以内に infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師