

(ダラキューロ)DKd療法【2コース目】(Day1,8,15)

【血液内科】158-1,8,15【多発性骨髄腫】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
カイプロリス	↓	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
レナデックス(経口)	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	5%ブドウ糖 250mL 2時間
※①	10時	同時に側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー モンテルカスト内服(主治医判断) ポララミン注5mg 1A オルガドロン注19mg 1V 5%ブドウ糖 100mL 30分
②	11時	●カイプロリス【 】mg 注射用水 5%ブドウ糖 100mL 30分 ※カイプロリス10mgは注射用水5mLで溶解 ※カイプロリス40mgは注射用水20mLで溶解
③	11時30分	●ダラキューロ配合皮下注 1V 皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下 に約3~5分かけて投与

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ダラキューロ	1回 1V (15mL)
カイプロリス	56mg/m ² mg/Body
オルガドロン	mg/m ² 19mg/Body
レナデックス(経口)	mg/m ² 20mg/Body

※ダラツムマブとして1800mg

◎75歳超:《Day1,8,15,22》20mg/body Day2,9,16,23は内服なし

■注意・確認事項

○カイプロリス、ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師