

(ダラキューロ)Dara+CyBorD療法【2コース目】

【血液内科】162【全身性ALアミロイドーシス】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	15	16	22	23	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ダラキューロ	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
ベルケイド	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
オルガドロン	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	
レナデックス(経口)	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	
エンドキサン(経口)	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	生食 100mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より カロナール内服 → 別途内服オーダー モンテルカスト内服(主治医判断) ポララミン注5mg 1A オルガドロン注19mg 1V 生食 100mL 30分
②	ダラキューロ 投与前	●ベルケイド ()mg 生食 1.2mL 皮下注射 ※ベルケイド1Vを生食1.2mLで溶解
③	11時30分	●ダラキューロ配合皮下注 1V 皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下 に約3~5分かけて投与

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ダラキューロ	1回 1V (15mL)	※ダラツムマブとして1800mg
ベルケイド	1.3mg/m ² mg/Body	
オルガドロン	mg/m ² 19mg/Body	
レナデックス(経口)	mg/m ² 20mg/Body	
エンドキサン(経口)	300mg/m ² mg/Body	※最大週間投与量 500mg

■注意・確認事項

- ダラキューロ投与中または投与開始後24時間以内に
infusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師