

# (ダラキューロ)Dara+CyBorD療法【3～6コース目】(Day8,22)

■エンボス

## 【血液内科】163-8,22【全身性ALアミロイドーシス】 (第      コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|      |     |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印   |

|       |                |     |       |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長:   | cm             | 体重: | kg    |
| 体表面積: | m <sup>2</sup> | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

| Day        | 1  | 2  | 8  | 9  | 15 | 16 | 22 | 23 | ~28 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 施行日        | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /   |
| ダラキューロ     | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| ベルケイド      | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |
| オルガドロン     | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓  | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| レナデックス(経口) | 休薬 | ↓  | ↓  | ↓  | 休薬 | ↓  | ↓  | ↓  |     |
| エンドキサン(経口) | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 | ↓  | 休薬 |     |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | 投与時間 |                                                                 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|
| ①   | 10時  | <b>●ベルケイド【      】mg</b><br>生食 1.2mL 皮下注射<br>※ベルケイド1Vを生食1.2mLで溶解 |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名        | 標準投与量                |                  |
|------------|----------------------|------------------|
| ダラキューロ     | 1回 1V (15mL)         | ※ダラツムマブとして1800mg |
| ベルケイド      | 1.3mg/m <sup>2</sup> | mg/Body          |
| オルガドロン     | mg/m <sup>2</sup>    | 19mg/Body        |
| レナデックス(経口) | mg/m <sup>2</sup>    | 20mg/Body        |
| エンドキサン(経口) | 300mg/m <sup>2</sup> | mg/Body          |

※最大週間投与量 500mg

■注意・確認事項

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |