

AML201地固め(A triple V)療法(Day8)

【血液内科】167-8【急性骨髄性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール：

Day	1	2	3	4	5	8	10	~
施行日	/	/	/	/	/			/
キロサイド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ベプシド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
フィルデシン	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 200mL 2時間
※①	10時	同時に 側管より グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●オンコビン()mg 15分 生食 50mL

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キロサイド	200mg/m ² mg/Body
ベプシド	100mg/m ² mg/Body
オンコビン	0.8mg/m ² mg/Body
フィルデシン	2mg/m ² mg/Body

→最高用量 2mg/body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師