

AML201地固め(AA)療法

【血液内科】168-1【急性骨髄性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :

Day	1	2	3	4	5	~
施行日	/	/	/	/	/	/
キロサイド	↓	↓	↓	↓	↓	
アクラシノン	↓	↓	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
		メイン輸液 ※臨時処方で別オーダー
①	10時	側管より グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	10時30分	●アクラシノン【 】mg 生食 100mL 30分
③	11時	●キロサイド【 】mg 生食 500mL 24時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キロサイド	200mg/m ² mg/Body
アクラシノン	20mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○アントラサイクリン系薬剤投与後症例にアクラシノン投与する場合、アクラシノンの総投与量が600mg以上になる症例では心電図異常の発現が増加するので注意すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師