

マイロターグ療法

【血液内科】175【急性骨髄性白血病】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :2週ごとを1コースとする

Day	1	8	~14
施行日	/	/	
マイロターグ	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	投与時間	
※①	10時	ソルデム3A 500mL 12時間
※①	10時	同時に 側管より ポラミン注5mg 1A 生食 100mL 30分
②	10時30分	ソル・メドロール注125mg 1V 生食 100mL 30分
③	11時	●マイロターグ【 】mg 注射用水 生食 100mL 2時間 ※マイロターグ1V当り注射用水5mLで溶解
④	22時	ソルデム3A 500mL 12時間 翌日10時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
マイロターグ	9mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- マイロターグ投与時は輸液バッグを遮光すること(ルートは遮光不要)。
- 投与中または投与開始後24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- 最大投与回数は2回とする。

入力 薬剤師	看護師	看護師